

## Dr. Brown's Natural Flow®-Babyfläschchen

### REINIGEN

Waschen Sie alle Teile vor ihrer Verwendung ab. Das Reinigen der zwei (2) zusätzlichen Teile des Entlüftungssystems dauert nur einen kleinen Moment. Dies lohnt sich jedoch, da Ihr Baby dadurch seltener spuckt und auch andere Unannehmlichkeiten seltener vorkommen.

1. Achten Sie bei der Verwendung stets auf saubere Hände und saubere Oberflächen.
2. Nehmen Sie alle Teile vollständig auseinander.
3. Silikonsauger – nur bei der ersten Verwendung: Legen Sie den Sauger fünf (5) Minuten lang in kochendes Wasser.
4. Waschen Sie alle Teile gründlich in heißem Wasser mit Spülmittel ab. Verwenden Sie für alle Löcher im Einsatz und im Behälter die mitgelieferte Bürste.
5. Spülen Sie die Teile gründlich. Stellen Sie dabei sicher, dass das Saugergloch sauber und offen ist.
6. Verwenden Sie eine Spülmaschine, dürfen alle Teile nur im obersten Fach gereinigt werden. Die Wassertemperatur darf 60°C nicht überschreiten.

### STERILISIEREN VON FLÄSCHCHEN UND SAUGERN

Sie können die Fläschchenausstattung sterilisieren, indem Sie die Einzelteile abkochen, in eine entsprechende chemische Lösung einlegen oder einen elektrischen oder Mikrowellen-

5. Die Komponenten dieses Fläschchens sind keine Spielzeuge und dürfen Kindern nicht zum Spielen oder Nuckeln gegeben werden.
6. Falls Sie Probleme mit dem Füttern oder Fragen zu diesem Thema haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder einen anderen Ansprechpartner des Gesundheitswesens.

### BITTE BEACHTEN

- A. Der beigefügte Sauger wurde speziell für die erste Verwendung des Dr. Brown's Natural Flow®-Entlüftungssystems durch den Säugling ausgewählt – ein System, das das ungehinderte Fließen beim Stillen nachempfunden. Schneller fließende Version der Stufe 2, Stufe 3, Stufe 4 sowie Y-Schnitt/Breihnahrungs-Versionen des Saugers sind für alle Babyfläschchen von Dr. Brown erhältlich. Es gibt auch eine langsamere fließende „Premie“-Version von Saugern (für Frühchen) – jedoch nur für das Standard-Fläschchen. Sauger anderer Hersteller können zu Lecks oder einer zu schnellen oder zu langsamen Abgabe des Inhalts führen.
- B. Wenn Ihr Baby trinkt, halten Sie das Fläschchen so, dass die Öffnung des Behälter-Röhrchens am Boden des Fläschchens nicht mit Flüssigkeit bedeckt ist (in einem Winkel von etwa 45 Grad).
- C. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Baby während des Fütterns aufrecht sitzt und nicht liegt.
- D. Durch das Entlüftungssystem wird kontinuierlich der Druck ausgeglichen. Die

Sterilisator verwenden. Bitte beachten:

- Halten Sie sich bei der Verwendung von chemischen Lösungen oder von Sterilisatoren strikt an die Anweisungen der Hersteller. Wir empfehlen Ihnen, Dr. Brown's Microwave Sterilizer [Mikrowellen-Sterilisator] zu verwenden.
- Dampf kann schwere Hautverletzungen hervorrufen. Seien Sie beim Abkochen der Fläschchenausstattung auf dem Herd oder beim Verwenden von Sterilisatoren besonders vorsichtig.
- Sorgen Sie dafür, dass Kinder keinen Zugang zu Komponenten haben, die momentan nicht verwendet werden.
- Waschen Sie sich vor dem Umgang mit sterilisierten Fläschchen, Saugern und Zubehörteilen die Hände gründlich mit Seife und Wasser.
- Vermeiden Sie den unnötigen Umgang mit sterilisierter Fläschchenausstattung.

### Zur Sicherheit und für die Gesundheit Ihres Kindes

#### WARNUNG!

- Dieses Produkt darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwendet werden.
- Benutzen Sie die Fütterungsauger unter keinen Umständen als Schnuller.
- Übermäßig langes Saugen von Flüssigkeiten kann Karies verursachen.
- Überprüfen Sie vor der Fütterung stets die Nahrungstemperatur.
- Überprüfen Sie die Sauger stets auf Abnutzungserscheinungen. Ersetzen Sie sie bei Beschädigung.

Bewegung von im Behälter-Röhrchen verbliebener Flüssigkeit ist daher normal.

- E. Bleibt der Behälter-Kolben zu mehr als 1/3 voll, wenn das Fläschchen senkrecht gestellt wird, überprüfen Sie bitte, ob die Saugeroöffnung offen ist und Einsatz und Behälter fest zusammengedrückt sind. Der Behälter-Kolben kann durch kurzes Lockern des Saugerrings geleert werden (vor dem Füttern stets wieder festziehen).
- F. Beim Transport müssen die Fläschchen stets senkrecht stehen.
- G. Damit das Fläschchen und die Entlüftung einwandfrei funktionieren können, sollten nur Handi-Craft- oder Dr. Brown's Natural Flow®-Sauger verwendet werden.
- H. Sind die Sauger nicht in Gebrauch, müssen sie vor direktem Sonnenlicht geschützt aufbewahrt werden. Es ist erwiesen, dass Sonnenlicht das Material der Sauger beeinträchtigt.
- I. Die Sauger sollten nach etwa sechs Wochen Einsatz ersetzt werden. Werden die Sauger intensiv verwendet und sterilisiert, kann ihr Material nach sechs Wochen an Qualität verlieren.

Alle Dr. Brown's-Fläschchen, -Sauger und Fläschchen-Zubehörteile werden nach Standard EN14350 getestet – dem europäischen Standard für die Babyfläschchenfütterung.

### ZUSAMMENBAU- und FÜTTERUNGSANLEITUNG (Bitte Diagramm beachten)

ANMERKUNG: DAS FLÄSCHCHEN KANN OHNE DEN EINSATZ UND DEN BEHÄLTER NICHT FUNKTIONIEREN.

1. **Beugen Sie der Bildung von Bläschen in Anfangsmilch vor:** Schütten Sie das Fläschchen nicht. Anfangsmilch sollte zum vollständigen Auflösen von Klümpchen vorsichtig gerührt werden. Diese könnten sonst die Saugerglöcher verstopfen. Als Rührer können Sie den Behälter verwenden.
2. Füllen Sie die gewünschte Menge ein. Die Entlüftung **funktioniert nicht richtig**, wenn Sie das Fläschchen über die ANGEZEIGTE MAXIMALE FÜLLMENGE hinaus auffüllen.
3. Rasten Sie den Behälter vollständig auf dem Einsatz ein.
4. Setzen Sie den Behälter in das Fläschchen ein, wobei der Einsatz vollständig am Oberteil des Fläschchens anliegen muss.
5. Rasten Sie den Sauger in den Saugerring ein, und setzen Sie ihn lose auf das Fläschchen.
6. **Aufwärmen des Fläschchens:** Nehmen Sie vor dem Erwärmen stets den Sauger und den Saugerring ab. Damit verhindern Sie, dass durch die Entlüftung Flüssigkeit austritt, wenn beim Erwärmen der Druck im Fläschchen zunimmt und Flüssigkeit in den Behälter steigt.
7. **Erwärmen Sie die Flüssigkeit maximal auf Körpertemperatur (37°C). Überprüfen Sie stets die Temperatur der Flüssigkeit, bevor Sie das Baby damit füttern.**

### 8. Füttern: Stellen Sie vor dem Füttern IMMER sicher, dass der Saugerring festgezogen ist.

9. Wenn Sie Anfangsmilch verwenden, müssen Sie sich bei der Zubereitung strikt an die Anweisungen des Herstellers halten.

### WARNHINWEISE

1. Wegen der Gefahren der Bildung einzelner heißer Stellen (Hotspots) in der Anfangsmilch und der Überhitzung der Anfangsmilch wird vom Gebrauch eines Mikrowellengeräts abgeraten. Falls Sie doch ein Mikrowellengerät verwenden, so denken Sie bitte daran, dass der Sauger und der Saugerring vor dem Aufwärmen stets entfernt werden müssen. **Überprüfen Sie vor dem Füttern – und nach dem gründlichen Verrühren, um heiße und kalte Stellen zu beseitigen – stets die Temperatur der Nahrung.**
2. Ziehen Sie vor jedem Gebrauch am Sauger, um sicher zu gehen, dass er nicht reißt. Ersetzen Sie den Sauger, wenn er Anzeichen von Abnutzung zeigt (z. B. Rissbildung oder Formveränderung).
3. Beenden Sie die Fütterung, bevor Ihr Baby den Sauger völlig entleert hat, damit Ihr Baby keine Luft schluckt. Ansonsten kann dies zu Koliken oder anderen Verdauungsproblemen führen.
4. Nehmen Sie Ihrem Baby das Fläschchen aus dem Mund, wenn es nicht mehr trinkt. Übermäßig langer Kontakt mit Milch, Anfangsmilch und anderen Flüssigkeiten kann Karies verursachen.



- 1 Abdeckung/Verschluss (mit drei Luftlöchern)
- 2 Saugerring
- 3 Sauger
- 4 Flaschenverschluss für unterwegs (nicht während des Fütterns verwenden)
- 5 Einsatz
- 6 Behälter-Kolben
- 7 Behälter-Röhrchen
- 8 **Zusammenbau der Entlüftung:** Um Lecks zu vermeiden, bitte fest zusammendrücken.

Um eine korrekte Fütterung sicherzustellen, sollten Sie nur Handi-Craft- oder Dr. Brown's Natural Flow®-Sauger verwenden.